

ДАПОКСЕТИН, инструкция по применению.

Данная инструкция содержит важную информацию о лекарственном препарате Дапоксетин, выпускаемом в таблетках по 60мг (далее по тексту Дапоксетин).

Внимательное прочтение данной инструкции является важным условием перед началом приема данного лекарственного препарата для того, чтобы убедиться в том, что он вам подходит.

Сохраните данную инструкцию как можно дольше на случай, если вы захотите перечитать ее. Если у вас имеется большее число вопросов, свяжитесь с вашим лечащим врачом или фармацевтом.

Состав:

Дапоксетина гидрохлорид. Упаковка: Блистер 10 * 60мг.

Показания:

Дапоксетин назначают для лечения преждевременной эякуляции у мужчин.

Действие:

Дапоксетин уникальный, короткого действия, селективный ингибитор обратного захвата серотонина (SSRI). Клинически доказано, что препарат является эффективным в лечении преждевременной эякуляции у мужчин в возрасте от 18 лет и старше. Примерно от 27 - 34% мужчин всех возрастных групп страдают от преждевременного семяизвержения, прием Дапоксетина продлевает длительность полового акта в 3 – 4 раза.

SSRIs блокирует рецепторы в коре головного мозга, поглощая серотонин, действуя избирательно и задерживая эякуляцию. В отличие от других препаратов селективного действия, эффект от приема которых достигается через 2 недели, Дапоксетина гидрохлорид начинает действовать с первого приема.

Продолжительность воздействия на организм относительно короткая от 2 до 3 часов, за это время концентрация Дапоксетина в крови снижается на 50% от первоначальной. Таким образом, оптимальный эффект достигается в течении от 30 минут до 2 часов после приема препарата.

Прием препарата:

Таблетки Дапоксетина 60мг принимать, запивая водой. Не употреблять более одного раза в день, при этом необходима консультация Вашего лечащего врача. Дапоксетин можно принимать как с пищей так и без приема пищи. Не рекомендуется чрезмерное употребление алкоголя при лечении преждевременной эякуляции.

Побочные эффекты:

При лечении Дапоксетином серьезных побочных эффектов не выявлено, при этом: тошнота наблюдалась у 8,7% мужчин при употреблении -60мг и 20,1% при употреблении высоких доз Дапоксетина; головная боль у 5,9% мужчин при употреблении -60мг и 6,8% при употреблении высоких доз; диарея у 6,8% мужчин при употреблении больших доз препарата; головокружение у 6,2% мужчин при употреблении больших доз Дапоксетина.

Если Вы почувствовали головокружение, тошноту или какой-либо другой неприятный эффект, прекратите прием препарата, и проконсультируйтесь с врачом! Не употребляйте алкоголь, который может усилить некоторые из побочных эффектов.

Противопоказания:

Вы не должны принимать Дапоксетин, если:

- у вас аллергия на Дапоксетин и лактозы, другие ингредиенты препарата;
- вы страдаете от острого цирроза печени (серьезной болезни печени);
- у вас сердечная недостаточность, аритмия или другие проблемы с сердцем.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Нельзя принимать Дапоксетин с любыми из следующих препаратов:

- Meds, используемые для лечения депрессии называется "моноаминов ингибиторы оксидазы" (MAOIs);
- другие препараты, используемые для лечения депрессии;
- препараты, применяемые при лечении шизофрении;
- лития, препараты для лечения биполярного расстройства (Керри Катона);
- Linezolid – антибиотик;
- Триптофан – снотворное;
- зверобой – фитотерапия;
- Трамадол - сильное болеутоляющее;
- препараты, применяемые для лечения мигрени.

Вы не должны принимать Дапоксетин одновременно с любыми из вышеупомянутых препаратов. Кроме того, необходимо остановить прием этих препаратов за 14 дней до начала приема Дапоксетина.

В течении 7 дней после окончания приема Дапоксетина запрещено пользоваться для лечения следующими медицинскими препаратами:

- некоторые лекарства, используемые для лечения грибковых инфекций, в том числе кетоконазол и итраконазол;
- лекарства, используемые для лечения ВИЧ-инфекции, в том числе ритонавир, нельфинавир и атазанавир;
- лекарства, используемые для лечения инфекции, в том числе telithromycin;
- Nefazodone – антидепрессанты;

Не принимайте Дапоксетин, если вы принимаете какие-либо из вышеупомянутых препаратов. Обязательно консультируйтесь с врачом если Вам необходимо принимать другие лекарственные препараты наряду с приемом таблеток Дапоксетина.

Не рекомендуется прием Дапоксетина с алкоголем, под воздействием алкоголя могут быть усилены побочные эффекты, что может привести к повышенному риску для вашего здоровья.

Вы также должны проконсультироваться с вашим доктором, прежде чем принимать Дапоксетин, если:

- у вас были когда-нибудь расстройства психического порядка;
- у вас проблемы свертывания крови, болезни почек, эпилепсия или головокружение, низкое кровяное давление.

Прежде чем вы начнете принимать Дапоксетин, необходимо проверить кровяное давление, оно не должно быть слишком низким.

[КУПИТЬ ДАПОКСЕТИН С ДОСТАВКОЙ В ИНТЕРНЕТ-АПТЕКЕ SAX-SEX.COM](http://SAX-SEX.COM)

